

بین ۷-۱۰ روز و حداقل ۲ هفته علائم شروع می‌شود. بیمار بطور ناگهانی دچار تپ، سردرد و درد عضلانی می‌شود و ممکن است علائم درد پشت چشم، درد و سفتی گردن، گلو درد، اسهال، استفراغ و درد شکم نیز ایجاد شود. معیناً ۴ روز پس از شروع این علائم دانه‌های فرم رنگ در دهان، گلو و بر روی پوست بدن ظاهر می‌گردد که در نهایت به ضایعات جلدی بزرگ تبدیل شده و فرد دچار خونریزی از قسمت‌های مختلف بدن مانند معده، روده، لثه، بینی، گوش، ملتحمه چشم، لثه و رحم می‌گردد. اگر بیمار قوت نکند، پس از اروز به تدریج ضایعات پوستی بر طرف شده و بیمار بهبود می‌پارد.



جهه گاز، گومند، بر، سگ، زرده، کرگدن، جوجه بیغه ... می‌باشد. پروندهای نسبت به این بیماری طالوم هستند ولی جملت آنوده بودن به که می‌توانند حامل بیماری باشند.



راههای انتقال بیماری

عطاها در مرگزش که و همچنین مستကلری و له کردن آن، ناسی با ادامه آبوده و یا اتصال با خون و ترشحات لثه دام آبوده در زمان دفع، مصرف

ب خونریزی دهنده گریه کنگو یک بیماری ویروسی است که دار مشترک بین انسان و حیوان است با وجودی بیماری مخصوص حیوانات است ولی مواد تک گیر و مه گیری‌های تاگهانی این بیماری در انسانها نیز اتفاق افتاد. ویروس با حمله به عروق کوچک بدن موجب هش استحکام و تخریب مویرگها و با شوک شدید و اذ به سرعت موجب مرگ می‌شود. اولین بار در منطقه ریشه در سال ۱۹۶۲، و بعد در سال ۱۹۵۶ در کشور گو شناسایی شد به این دلیل و بخاطر علامت بیماری انسان، به نام تب خونریزی دهنده گریه کنگو گروف گردید البته این بیماری در آرژانتین، افریقا و آسیا (از جمله ایران) نیز دیده می‌شود.





معاونت بهداشتی



گوشت سالم و بهداشتی که دارای مهر ناجزگش است .
استفاده نمایم .

از خوردن گوشت ، چنگ خام با نیم پخته و . جدا خودداری نموده و حداقل بدن ۲۴ ساعت در بینال نگهداری و سپس مصرف نمایم .

کلیه کارگران بروشگر باید احتمالات طاعقی را در بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی درمانی آزمایشگاه ها و .. رعایت نموده و هنگام لزمه خدمات به بیماران از وسائل حافظه مانند دستکن ، ماسک ، عینک ، گلن و ... استفاده نمایند .

رجایت اصول صحیح ایزو ۹۰۰۱ بیمار در بیمارستان را جدی بگیریم و کلیه وسائل و همچنین محل اقامت بیمار باید ضد عفونی گردد .

جهت پیشگیری و کاهش مرگ ناشی از بیماری ، شناسایی و درمان به موقع بیماران را جدی بگیریم .

حتی العقدور از جایگاهی بیمار در بخشها و بیمارستانهای مقاومت خودداری نمایید .

در حالت ناسالم با بیمار با سایر ترشحات و مولا دفعه

ر تعامل به يومی شدن بیماری ، شدت و وحامت بیزان مرگ و میر زیاد ، عوارض و ضرر و زیان قابل توجه ، توانایی انتقال سریع در بیمارستان اکثر بهداشتی درمانی ، در دسترس نبودن واکسن و بیوتروپریسم بودن ویروس آن سبب رعب و در جامعه می شود .

افراد در معرض خطر بالا

کارگنان کشتارگاه ها ، قصاب ها ، خاتم های ار ، دامپزشکان ، کارگنان شاغل در مراکز و درمانی بیشتر در معرض خطر هستند .

تشخیص

بیماری از طرق آزمایش نمونه های خون و یا مار مشکوک صورت می گیرد .

درمان

ربماورین دارای اثر ضد ویروسی اختصاصی بر